

4/ *Peziza badioides* nov. sp.

Apothécies cupulées, extérieur marron brunâtre olivâtre (densément et finement furfuracé de brun surtout à la marge) ; base orangé brun plus ou moins ochracé.

Hyménium brun olivâtre -pas de violet à la coupe-.

Mycélium roux.

Spores : 15 - 18x8 - 9  $\mu\text{m}$  ellipsoïdales à subnaviculaires sans les verrues (16 - 20  $\mu\text{m}$  avec). Grosses verrues, espacées, plus ou moins anastomosées ou soudées surtout aux pôles où elles forment un apicule large et plat. 1 à 2 guttules fugaces (Planche II, e).

Asques : 300  $\mu\text{m}$ . J<sup>+</sup>.

Paraphyses cylindriques (4 - 4,5  $\mu\text{m}$ ) peu épaissies (5 - 6  $\mu\text{m}$ ), droites, simples, quelquefois tordues au sommet.

Nous avons pensé à une variété de *P. badia* ou de *badioconfusa* mais la chair est très différente. Récolte au Villard de Ternignon (Maurienne - Savoie) en septembre 1978.

*Peziza badioides* DONADINI nov. sp.

*Apothecies cupulata sessilia. Hymenium brunneo-olivaceum. Exterius brunneus . Sporae ellipsoideae 16 - 20x9 - 10  $\mu\text{m}$  verrucosae. Asci 300  $\mu\text{m}$ . Paraphyses cylindricae 4 - 5  $\mu\text{m}$  crassae, 5 - 6  $\mu\text{m}$  ad apices. Typus in Herbario nostro sub n° 210 - 78.*